



平成29年度 入園のしおり



一般財団法人 京都流民総合交流事業団

京都テルサ保育園

京都市南区東九条下殿田町 70 京都テルサ東館 1F

京都テルサ保育園の概要

名 称	京都テルサ保育園
種 別	企業主導型保育園
経 営 主 体	一般財団法人 京都府民総合交流事業団
代 表 者	理事長 園田 能夫
所 在 地	京都市南区東九条下殿田町 70 京都テルサ 1F
連 絡 先	京都テルサ保育園 TEL：075-692-3425 京都府男女共同参画センター TEL：075-692-3433（代表） FAX：075-692-3436
相 談 窓 口	京都府男女共同参画センター 保育担当 TEL：075-692-3433（代表）
開 所 時 間	月曜日～土曜日 午前8時～午後7時
休 園 日	日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
定 員	15名（0歳児～2歳児）
開 設 年 月 日	平成29年11月1日

企業主導型保育園

国が待機児童解消を目的として助成する平成28年度スタートの認可外保育園事業実施者あるいは事業実施者と共同利用契約している事業者には雇用されている保護者のお子様が入園できます（従業員枠）
また、空き定員がある場合定員の50%以内に限り、一般事業者には雇用されている保護者のお子様が入園できます（地域枠）

利用について

【月極】

月極利用料 ※1	
0 歳 児	¥35, 900
1 ~ 2 歳 児	¥35, 700
その他 ※2	
傷害保険料（利用者負担分）	¥（29年度については不要）
連 絡 帳	¥（29年度については不要）
保 育 材 料 費	¥（29年度については不要）

※1 所得の差異にかかわらず一律料金となります。

※2 行事にかかる費用等については、随時保護者に説明・同意の上徴収します。

【一時預かり】

1. 利 用 料 …… 1 日 ¥2, 100
2. 保 育 時 間 …… 月曜日～土曜日 8:00～19:00

※ 10日前までの予約となります
状況により、お預かりできない場合がありますので事前にお問い合わせください

一日の保育スケジュール

時間帯	活 動
8:00	随時登園 検温、健康観察 自由遊び
9:00	排泄、おむつ交換 手洗い
9:30	おやつ
10:00	設定保育
11:00	給食 排泄、おむつ交換、着替え
12:00	午睡
14:50	起床 排泄、おむつ交換、手洗い
15:00	おやつ
16:00	順次降園
19:00	



★その他

身体計測、避難訓練は毎月実施します

通園に際してのお願い

- ① 欠席あるいは遅れる場合は、必ず登園予定時刻までに連絡してください。
- ② 毎日、健康状況（顔色、発熱、食事の量、便の状態等）を観察し、気になる場合はお知らせください。
- ③ 保育中に体の具合が悪くなったり、怪我等した時には、連絡をします。状況によってはお迎えに来ていただくこともあります。
- ④ 保育園への送迎は、保護者が行ってください。
（迎えに来る方が、いつもと異なる場合は、必ず保護者が連絡してください。）

連絡がない場合は、お子様をお渡しすることは出来ません。

⑤ 保護者の連絡先は、明確にしておいてください。

持ち物について

持ち物には、全て名前（フルネーム）をはっきり記入してください。

<input type="checkbox"/> おむつ	7 枚	<input type="checkbox"/> おふきタオル	2 枚
<input type="checkbox"/> おしりふき	1 個	<input type="checkbox"/> 哺乳瓶またはマグマグ 月齢に応じて持参	
<input type="checkbox"/> ナイロン袋（汚れ物用）	3 枚		
<input type="checkbox"/> 着替え	3 回分	<input type="checkbox"/> 連絡帳	
<input type="checkbox"/> よだれかけ	3 枚		

給食について

主食、副食を含めた完全給食を提供します。離乳食は、個々の発育状況に合わせた調理をします。献立表を月末に配布します。また、当日の献立については、入口にあるホワイトボードをご確認ください。

アレルギーのあるお子様は、除去食で対応します。医師の診断書をご提出ください。

服装について

- 活動しやすく、着脱しやすいものにしてください。
- 吊りズボン、スカート、スカート付きズボン、フード付き洋服、ボタン付き洋服は避けてください。
- 散歩に出かけることもあるので靴は運動靴を履かせてください。
- 髪をピンで留めたり、飾り付きのゴムは危険ですので避けてください。

健康管理について

1. 保育中の体調の変化の場合
保育中に体調がすぐれない時、体温が 37.5℃以上になりましたら指定された連絡先へ連絡いたします。その場合は、速やかにお迎えをお願いします。
2. 急な病気や怪我の場合

医師の処置が必要とみられる場合は、保護者へ連絡の上、保育園で医療機関を受診します。ご了承ください。

3. 投薬について

与薬は原則行うことはできません。保育園で飲まなくていいように医師に相談していただくか、給食後、保護者の方が飲ませに来てください。

4. 伝染性感染症の疑いがある場合

保育園は集団生活の場です。集団発生や流行を防ぐため感染症に罹患した時は、登園できません。再登園の時は、病状により医師が記入した登園許可証や保護者が記入した登園届が必要になります。（別紙参照）また、診断書の提出をお願いする場合があります。なお、当園での感染症が発生した場合は、掲示板や保育士によりお知らせいたします。

5. 予防接種について

予防接種は、計画的に体調に配慮し受けてください。予防接種を受けた場合は、予防接種の項目を保育園にお知らせください。



【嘱託医】

清水医院（小児科）	京都府京都市南区西九条島町 38 075-691-7087
西田歯科（歯科）	京都府京都市南区東九条西山町46-1 075-691-5000

災害時について

1. 京都テルサ保育園あるいはその周辺で災害等の緊急事態が発生し、当園からお迎えの連絡をした場合は速やかにお迎えをお願いします。
2. 午前7時時点で京都市地域に暴風警報が発令した場合は、閉園とします。

主な感染症の症状と登園の目安

病名	主な症状	登園の目安
インフルエンザ	高い発熱、頭痛、食欲不振、関節の痛み、鼻汁、喉の痛み、咳など様々な症状を伴います。	発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 3 日を経過してから
麻疹 (はしか)	はじめの 2~3 日は、熱、咳、鼻水、目やに等の風邪症状が出、一旦熱が下がりますが、再び高熱が出ると同時に顔、耳、首の後ろや胸の上方から発疹ができた後全身へと広がっていきます。	解熱後 3 日を経過してから (約 2 週間)
風疹 (3 日麻疹)	感染して 2~3 週間後に、赤くて小さな発疹が全身にできます。発疹は麻疹に似ていますが、色が薄く細かい発疹が多いようです。	熱がなく、発疹が消えてから
水疱瘡 (みずぼうそう)	感染して 2~4 週間後に頭、頭髮部、胸、お腹、背中などから紅斑が出現し、数日以内に水ぶくれができます。	すべての発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	耳の下(耳下腺)が腫れて痛がります。普通左右とも腫れますが、片方だけのこともあります。腫れは 1 週間程度で軽快していきます。	耳下腺、顎下線、舌下線の腫脹が発現してから 5 日を経過し、かつ全身状態が良好になってから
結核	咳、痰、発熱(多くは微熱)などが数週間から数ヶ月続くか、あるいは症状が現れては消えるといった繰り返される場合もあります。	医師により感染の恐れがないと認められてから
咽頭結膜熱 (プール熱)	39~40℃の高熱が 3~7 日間続き、強い喉の痛みがあり、目は充血します。プールに入らなくてもうつります。	主な症状が消え 2 日経過してから
流行性角結膜炎 (はやり目)	目が充血し、腫れて目やにが出ます。	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから
百日咳	くしゃみ、涙が出たり、軽い咳、微熱といった風邪のような症状からやがて激しく咳き込むようになります。	特有の咳が消失してから又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了してから
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157 等)	腹痛と激しい血便があります。	症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48 時間をあけて連続 2 回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されてから
急性出血性結膜炎 (アポロ病)	結膜炎の症状から強い結膜充血・まぶたの腫れ・白目に点状の出血・まぶたの裏に白いブツブツ・黒目の濁り等	治るのに 10 日ほどかかる。医師により感染の恐れがないと認められてから
病名	主な症状	登園の目安

帯状疱疹 (ヘルペス)	胸・首・顔・腰などに小豆大の水疱が帯のように分布するとともに、ピリピリと又は締め付けられるような痛みを伴います。	全ての発疹が痂皮化していること
マイコプラズマ肺炎	発熱、乾いた激しい咳が出て、全身倦怠感、頭痛などを伴います。	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手・足・おしり・口の中などに小さな水ぶくれができます。時に高熱が出ることもあります。	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が摂れること
伝染性紅斑 (りんご病)	頬にリンゴのような紅斑ができます。また手足にも赤い斑点やまだら模様ができます、痒くなることもあります。	全身状態が良いこと
ウィルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウィルスなど)	突然吐き始め、水のような下痢（レモン色～白色）になります。熱が出ることもあります。	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事が摂れること
ヘルパンギーナ (夏風邪)	乳幼児に流行する夏風邪の一種で、38～40℃の高熱が出て、喉の奥に水ぶくれができます。	発熱や口腔内の水疱、潰瘍の影響がなく、普段の食事が摂れること
突発性発疹	多くは1歳前後の乳幼児にみられ、三日程度の高熱が続き、解熱するとともに発疹がみられます。	解熱し、機嫌が良く全身状態が良いこと
溶連菌感染症	発熱（38～39℃）と、喉の痛み、嘔吐などの症状から始まり、その後、痒みを伴う赤く細かい発疹が体、手足に現れたり、舌に苺のようなブツブツが発生して（苺舌）、熱が下がると手足の皮膚がむけることもあります。	抗菌薬内服後24～48時間経過していること。
RSウイルス感染症	38～39℃の発熱や鼻水、咳などの普通の風邪の症状から悪化すると細気管支炎や肺炎を引き起こす。	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと